

นายเฉลา สัทธาสัย หรือที่ส่วนใหญ่ รู้จักกันในชื่อ “เสี้ยเกา” เป็นเกษตรกรคนเก่งจากตำบลแสนตั้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำเงาะลำหรือเงาะหลังฤดูปลูกทำให้สามารถขายผลผลิตได้ราคาที่ดีกว่าขายในช่วงฤดูปลูก ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่คุณเฉลา ทำเงาะลำนอกจากเรื่องราคาที่พอใจแล้ว ปัญหาด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ด้วยสวนคุณเฉลามีการปลูกพืชหลักนอกจากเงาะแล้วก็คือ มังคุด ดังนั้นการจัดการแรงงานจึงมีความสำคัญ การทำเงาะลำช่วยให้มีเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดได้แล้วเสร็จ



เทคนิคการผลิตเงาะลำเงินล้าน ฉบับเฉลา สัทธาสัย

1) การวางแผนการผลิต

การวางแผนการผลิตของคุณเฉลา จะเน้นการสังเกตจากสวนที่ผลิตตามปกติ โดยจะรอให้สวนที่ผลิตปกติดอกบานแล้วจึงจะเพิ่มการให้น้ำเพื่อกระตุ้นให้ดอกออก ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตออกช้ากว่าเกษตรกรรายอื่นๆ อย่างน้อย 15 วัน

2) การตัดแต่งกิ่ง

การตัดแต่งกิ่งควรเน้นให้โปร่ง เหลือไว้เฉพาะกิ่งที่สามารถให้ผลผลิต กิ่งที่เหลือก้านน้อยๆ ควรตัดออกไปเพื่อไม่ให้แย่งอาหาร รวมถึงควรมีการกำจัดอีเปะและกาฝากที่ติดอยู่ตามต้นออกให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของศัตรูพืชและแย่งอาหาร โดยเทคนิคของคุณเฉลาคือใช้พาราควอท ฉีดพ่น ในวันที่ไม่มีลม ด้วยเครื่องพ่นสะพายหลัง ซึ่งลดการใช้แรงงานลงได้ โดยจะฉีดประมาณ 2 ครั้ง

3) การยืดอายุการเก็บเกี่ยว

การทำเงาะลำ จะมีช่วงที่ใช้ยืดเวลาอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงออกดอก ทำการยืดระยะเวลาให้ออกดอกช้า โดยการบังคับน้ำ และช่วงที่เป็นเงาะ 3 สี จะทำการยืดเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้เฟอรัสซัลเฟต ฉีดพ่นเพื่อยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวไปได้ถึง 15-30 วัน

4) การจัดการผลผลิตในช่วงฤดูฝน


การทำเงาะลำจะมีความเสี่ยงต่อผลผลิตเสียหายในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันไม่มีแสงแดด มีโอกาสที่ผลจะร่วง เกษตรกรต้องใช้ฉีดพ่นน้ำตาลทางด่วนพร้อมเฟอรัสซัลเฟตอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้ผลผลิตที่เหลืออยู่ได้รับอาหารเพียงพอ

5) การใช้ปุ๋ยผสมเองเพื่อลดต้นทุน

การผสมปุ๋ยใช้เองเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ สามารถกำหนดสูตรให้ตรงตามความต้องการของพืชได้ดี

เฉลา สัทธาสัย

“เงาะลำ ลำเงินล้าน”



โดย :

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากาการผลิต
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
โทร.039-511008 โทรสาร 039-523385
<http://www.trat.doae.go.th>

ปฏิทินการปฏิบัติดูแลรักษาเงาะ นายเจลา สัตยาสัย (เงาะล่า ลำเงินล้าน)



มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมการให้น้ำ ฉีดสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและราแป้ง 	<ul style="list-style-type: none"> เริ่มเพิ่มน้ำและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ทำการเปลี่ยนเพศดอก 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและราแป้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นน้ำตาลทางด่วน ฉีดพ่นปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นฮอร์โมนและเฟอรัสซัลเฟต ฉีดพ่นสารป้องกันผลเน่า 	<ul style="list-style-type: none"> เก็บเกี่ยวผลผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 	<ul style="list-style-type: none"> ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ฉีดสาร-ป้องกันกำจัดหนอน/แมลงและเชื้อรา ฉีดพ่นอาหารเสริม 	<ul style="list-style-type: none"> พ่นปุ๋ยทางใบ ฉีดสารป้องกันกำจัดหนอน/แมลงและเชื้อรา ฉีดพ่นอาหารเสริม 	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมการให้น้ำ ฉีดสาร-ป้องกันกำจัดหนอน/แมลงและเชื้อรา 	<ul style="list-style-type: none"> ควบคุมการให้น้ำ ฉีดสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟและราแป้ง
<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นสารไซเปอร์เมทริน/อิมิดาคลอพริดและสารกลุ่มคอปเปอร์ 		<ul style="list-style-type: none"> ใช้แพลนโนฟิกซ์ 1 CC/น้ำ 1 ลิตรฉีดพ่นเป็นจุดๆ 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นสารกำมะถัน + สารไซเปอร์เมทริน 3 กิโลกรัม ต่อน้ำ 1,000 ลิตรฉีดพ่น 3 ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นน้ำตาลทางด่วน ช่วงออกขน (ลูกเท่าปลายตะเกียบ) 	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนสุก 45 วัน (ระยะสร้างเนื้อ) ฉีดพ่นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลและเฟอรัสซัลเฟต (เหล็ก 15%) 2-3 ครั้ง (10 วันครั้ง) ใช้สารโพรคลอราชฉีดพ่น 2 ครั้ง 		<ul style="list-style-type: none"> ใช้ปุ๋ยสูตร 18-10-8 (ผสมเอง) ใส่ปุ๋ยธาตุรอง (Mg Cl) 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ปุ๋ยสูตร 18-10-8 (ผสมเอง) ใส่ปุ๋ยธาตุรอง (Mg Cl) ฉีดพ่นสารไซเปอร์เมทริน/และสารกลุ่มคอปเปอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ปุ๋ยสูตร 30-10-10 ฉีดพ่นสารไซเปอร์เมทริน/และสารกลุ่มคอปเปอร์ สารสกัดจากสาหร่ายทะเล 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นสารไซเปอร์เมทริน/และสารกลุ่มคอปเปอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> ฉีดพ่นสารไซเปอร์เมทริน/อิมิดาคลอพริดและสารกลุ่มคอปเปอร์ ฉีดพ่นเมื่อพบการเข้าทำลายแล้ว
	<ul style="list-style-type: none"> สังเกตว่าสวนส่วนใหญ่ดอกเริ่มบานแล้วจึงเริ่มเพิ่มน้ำ 						<ul style="list-style-type: none"> ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง กิ่งที่เหลือก้านน้อยๆ เอาออก 				