



ข่าวพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช !!!

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

“ลดต้นทุนและปลอดภัย หากเกษตรกรใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน”

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒๔/๒๕๖๕)

หนองเจ้าเมล็ดทุเรียน

ในช่วงนี้ มีฝนตกลงมาทำให้ดินมีความชื้นซึ่งมีสภาพเหมาะสมต่อการฟักออกเป็นตัวเต็มวัยของหนองเจ้าเมล็ดทุเรียน สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดขอแจ้งให้เกษตรกรมั่นสำรวจแปลงทุเรียนและเฝ้าระวังการระบาดของหนองเจ้าเมล็ดทุเรียนโดยเฉพาะสวนทุเรียนที่อยู่ในระยะติดผล


รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

หนองเจ้าเมล็ดทุเรียน (Durian seed borer) หรือที่เกษตรกรเรียกว่า กบหัว เป็นแมลงที่กินเนื้อเมล็ดทุเรียน หรือหนองเจ้าเมล็ด ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกางคีน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Mudaria luteileprosa* Holloway ผีเสื้อมีสีน้ำตาลอ่อนเทา มีจุดสีขาวบนสันหลังอก มีจุดใหญ่ที่ขอบปีกอย่างน้อย ๓ จุด และจุดเล็กที่มุกปีกอีก ๑-๓ จุด ระยะไข่นาน ๒-๓ วัน หนอง ๓๘ วัน ตักแต่ประมาณ ๑ เดือน และตัวเต็มวัย ๗ - ๑๐ วัน ตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ ๑๐๐ - ๒๐๐ พอง โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บริเวณหนามทุเรียนใกล้ชั้วผล ตัวหนองที่ฟักออกจากไข่จะเข้าไปภายในผลและอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ด ตัวหนองโนโตเต้มที่มีขนาดยาวประมาณ ๕ เซนติเมตร เข้าดักแด้ในดินที่ชื้นนาน ๑ - ๙ เดือน จึงฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย ตักแต้อาจมีอายุนานกว่านั้น ในกรณีที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม แต่ถ้ามีฝนตกหนักจะช่วยกระตุ้นให้ออกเป็นตัวเร็วขึ้น



ลักษณะการทำลาย

หนองเจ้าเมล็ดทุเรียนจะเข้าไปภายในเมล็ด กัดกินและขับถ่ายมูลออกจากเนื้อทุเรียน ประโยชน์เสียหาย โดยตัวเต็มวัยจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บริเวณหนามทุเรียนใกล้ชั้วผล ตัวหนองที่ฟักออกจากไข่จะเข้าไปในผลและอาศัยกัดกินอยู่ภายในเมล็ดโดยไม่ทำลายเนื้อทุเรียนเลย และเมื่อมองจากภายนอกผลจะปราศจากร่องรอยของการทำลายผิวผล ยกเว้นจะมีทางเดินเล็กๆ ระหว่างเนื้อและผิวเปลือกด้านในจะมีรอยเป็นเส้นช่องเมล็ดที่ถูกทำลายส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะที่เมล็ดแข็งแล้ว โดยหนองจะใช้เวลาเดินทางอยู่ภายในเมล็ดจนกระทั่งตัวหนองโนโตเต้มที่จะเจาะรูเพื่อออกจากการผลทุเรียนและเข้าดักแด้ในดิน เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจึงออกเป็นตัวเต็มวัย รูที่หนองเจ้าเมล็ดกัดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ - ๘ มิลลิเมตร รอบๆ ปากจะมีขุยสีขาวปนสีส้มติดอยู่ ผลที่ถูกทำลายไม่สามารถขยายเพื่อรับประทานสดได้ ต้องนำไปแปรรูปเป็นทุเรียนกวนเท่านั้น ซึ่งราคายังคงสูงกว่าผลสด



ลักษณะการทำลายของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

การเฝรeriorization และถดที่มีการระบาด

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแพร่ระบาดในพื้นที่ป่าลูกทุเรียนของภาคใต้และภาคตะวันออก (-rayong จันทบุรี ตราด)
โดยพบรอบมากระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

การป้องกันและกำจัด

๑. ติดตามสถานการณ์หนอนเจาะเมล็ดโดยตรวจดูตัวเต็มวัยของหนอนเจาะเมล็ดในกับดักแสงไฟในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ดังนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม ตรวจดู ๒ - ๓ ครั้ง/สัปดาห์ และในเดือนมีนาคม - เมษายน ตรวจดูทุก
วัน หากมีผ่านตกหนักติดต่อกัน ๒ - ๓ วัน ควรตรวจดูทุกวัน

๒. รักษาสวนให้สะอาดอยู่เสมอ หมั่นตรวจสอบหลังทุเรียนติดผลแล้ว เมื่อพบผลที่ถูกทำลายหรือผลร่วงใน
สวนที่มีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ด ควรเก็บผลร่วงไปเผาทำลายทิ้งทุกวัน เพื่อลดการเพิ่มปริมาณ เนื้องจาก
หลังจากทุเรียนร่วงไม่นาน ถ้ามีหนอนอยู่ภายในหนอนจะเจาะรูอกมาเพื่อเข้าดักแด้ในดิน

๓. ห่อผลทุเรียนโดยใช้ถุงพลาสติกสีขาวขุ่น เจาะด้านล่างถุงเพื่อให้สามารถระบายน้ำออกได้ ป้องกันน้ำเสื่อมมา
วางไข่ ควรเริ่มห่อผลเมื่อทุเรียนอายุได้ ๑ เดือนครึ่ง

๔. ใช้กับดักแสงไฟสีน้ำเงิน-ดำ (Black-blue light trap) ล่อตัวเต็มวัยมาทำลาย ช่วงที่เหมาะสมตั้งแต่เวลา
๒๑.๐๐ น เป็นต้นไป และควรทำโดยพร้อมเพรียงกันทุกสวน ซึ่งจะทำให้ลดปริมาณการระบาดลงได้ และผลจากการ
ติดตั้งกับดักแสงไฟจะทำให้พบว่าเริ่มมีผีเสื้อในช่วงไหน เพื่อวางแผนการป้องกันกำจัดได้ถูกช่วงเวลา

๕. เมื่อพบตัวเต็มวัย ๑ ตัวในกับดักแสงไฟ ทำการสำรวจไข่ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่ร่องหนามของผล
ทุเรียนแล้วเก็บทำลาย หรือใช้สารเคมีฉีดพ่นที่ผลทุเรียน เช่น ไซเพอร์เมทริน+โพชาโนน ไดอะซินอน อีโนโดซัลแฟน
แอลบีด้า-ไซยาโนฟาริน อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลาก และควรฉีดพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย ๑๕ วัน

๖. แซ่เมล็ดด้วยสารเคมีcarbaryl ก่อนนำเมล็ดทุเรียนจากแหล่งที่มีการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดไปขยายพันธุ์

กลุ่มอาชีวศึกษา สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด

๑๖ ถนนนิยม ต. บางพระ อ. เมืองตราด จ. ตราด

โทร. ๐๓๘-๕๑ ๑๐๐๔ โทรสาร ๐๓๘-๕๒๗๗๕๕

<http://www.trat.doae.go.th>

E-mail: aragkha_trat@hotmail.com

ผู้จัดทำ: นางสาวครองทรัพย์ สิงหาราช ที่ปรึกษา: นายสายชล เจริญพร